



LUEGO DE LA VACUNA ¿QUÉ HACEMOS?



MANUEL
DOBLADO

Datos:

Aunque los casos de infección, luego de recibir la vacuna, son poco frecuentes debemos seguir mantenido medidas precautorias como es el uso de cubrebocas debido a que el virus continúa circulando de manera amplia entre la población.

Debemos tener en cuenta que ninguna vacuna es perfecta y que las inyecciones que recibimos tienen eficacia entre un 50% y un 95% en un ensayo clínico, por lo que actualmente ya existen algunos casos reportados de personas que se han infectados después de ser parcial o incluso completamente vacunadas.

Aun no queda claro cuántos de ellos tendrán una infección pos vacunación, aunque existen nuevos informes indican que el número es muy pequeño, pero no por eso debemos bajar la guardia recordemos que nos enfrentamos a un virus mortal.



Aunque estos casos de infección posvacunación son muy raros, constituyen un recordatorio preciso de que las personas vacunadas no son invencibles, especialmente cuando el virus continúa circulando de manera extendida.

Debemos tener en cuenta que estos datos no deben conducir a que las personas digan: ‘Vamos a vacunarnos y podremos dejar de usar cubrebocas’”, Estas medidas tienen que continuar hasta que un gran segmento de la población haya sido vacunado.

Se han realizado estudios en algunas personas sobre todo trabajadores de la salud en el estado de California en donde algunas personas después de vacunarse presentaron síntomas leves y no ameritaron hospitalización, incluso algunas personas no tuvieron ningún síntoma y solo se descubrió a través de pruebas para estudios o como parte de su atención médica, se dice que la ausencia de síntomas puede haber significado que la vacuna estaba haciendo exactamente lo que se supone que debe hacer: evitar que la gente se enferme, pero no bloquea por completo que el virus la infecte.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por su sigla en inglés) de Estados Unidos tienen un pequeño equipo que estudia los casos de infección posvacunación, Un aspecto que los investigadores están considerando es si las variantes particulares del coronavirus podrían desempeñar un papel en los casos de infección posterior a la vacunación.

Actualmente, no existe evidencia de que la COVID-19 después de la vacunación esté ocurriendo debido a cambios en el virus es debido a eso que se siguen haciendo investigaciones al respecto y si insiste en que no debemos bajar la guardia.

En los próximos meses, se espera que se den a conocer datos que deben indicar con qué frecuencia las personas vacunadas se infectan con el virus, incluso si no tienen síntomas. Las compañías han hecho pruebas a participantes en sus ensayos clínicos en búsqueda de anticuerpos a una proteína llamada N que es parte del coronavirus, pero no parte de la vacuna. El hallazgo de esos anticuerpos significa que una persona vacunada ha sido infectada por el virus. Algunos voluntarios de los estudios también son sometidos, de manera regular, a un hisopado con el fin de detectar si tienen una infección viral activa.

Actualmente en el estado de Guanajuato se tienen 87 casos reportados de adultos mayores que ya contaban con una o las dos vacunas, posiblemente esto sucede debido a que los pacientes tuvieran una falsa sensación de seguridad, por lo que dejaron de tomar las medidas básicas de cuidado como el uso de cubrebocas, la sana distancia y el lavado constante de manos.

Por el momento, si ya completó su vacunación usted debe seguir tomando medidas para protegerse y proteger a los demás en muchas situaciones, como usar mascarilla, mantenerse al menos a metro y medio de distancia de las demás personas, evitar las multitudes y los espacios con mala ventilación.

MANUEL
DOBLADO

MANUEL
DOBLADO

MANUEL
DOBLADO

MANUEL
DOBLADO


MANUEL
DOBLADO

MANUEL
DOBLADO

MANUEL
DOBLADO

MANUEL
DOBLADO

MANUEL
DOBLADO



Siga tomando medidas de precaución al:

- Estar en público
- Reunirse con personas no vacunadas de más de un hogar
- Visitar a una persona no vacunada que tiene mayor riesgo de enfermarse gravemente o morir a causa del COVID-19 o que vive con una persona con mayor nivel de riesgo
- Debe seguir evitando las congregaciones medianas o numerosas.
- Evite viajar, pero es necesario, debe seguir tomando medidas para protegerse y proteger a las demás personas.
- Se le exigirá que use mascarilla en aviones, autobuses, trenes y otros medios de transporte público
- Debe seguir estando atento a los síntomas del COVID-19, especialmente si ha estado con alguien enfermo. Si tienes síntomas del COVID-19, debe realizarse una prueba de detección, además de quedarse en casa y mantenerse alejado de las demás personas.
- Debe seguir cumpliendo las guías en su lugar de trabajo.

Es posible.

www.cdmanueldoblado.com.mx



Manuel Doblado



@manuel.doblado

